

Varakevadel tõrjuge taimehaigusi

Läheneb aiatöörohk aeg. Praegu on õige hetk mõelda, kas aias tuleks teha taimekahjustajate tõrjet või mitte. Vajadus sõltub sellest, kui palju kahjustajad eelmisel aastal aias kurja tegid.

Keskkonna huvides pole õige teha tõrjet igaks juhuks.

Võtke midagi ette vaid nende kahjustajate vastu, kes mullu teie aias esinesid. Kontrollige puutüvesid: vaadake, kas seal on samblikke või korpa, mille all kahjurid võivad peidus olla.

Kergem on leida pestitsiidi, mis hävitab haigusi, talvitunud kahjurimunade hävitamiseks tõhusat preparaati soovitada on märksa raskem. Varakevadel on otstarbekas tõrjuda taimehaigusi. Kahjurite tõrjet alustage siis, kui leiate esimese putuka, mune ja vastseid.

Millist pestitsiidi kasutada?

* Vaskoksiidkloriidi 1,5% lahust võiks kasutada seenhaiguste tõrjeks. Kirjanduses pakutud 2–3% kontsentratsiooniga lahus võib mõningaid viljapuusorte kahjustada. Pritsige enne pungade puhkemist. Preparaat mõjub samblikele, seenhaigustest kärntõvele, puuviljamädanikule ja lehepõletikule.

* Vaskoksiidkloriidi ja karbamiidi segu, mille on välja töötanud Norra hobiaednikud, kasutage siis, kui teie taimi mullu kärntõbi vaevas. Segu koosneb 120 g vaskoksiidkloriidist ja 300 g karbamiidist, mis lahustatakse 10 liitris vees.

* Vaskvitriol ehk vasksulfaat sobib samuti. Taimekaitstes kasutatavas vasksulfaadis peaks olema 94–98% toimeainet, s.t puhas vasksulfaat. Vasksulfaat toimib kiiresti, tungides taimekudedesse. Toimelt sarnaneb see vaskoksiidkloriidiga.

Töölahuse kontsentratsioon on 1–1,5%. Preparaadi üledoseerimine võib viljapuid kahjustada.

* Raudsulfaadi 3–5% kontsentratsiooniga lahus on enam-vähem sama toimega kui vaskvitriol.